

STINE 47EA32



SEMBRÁ
EVOLUCIÓN




"Después de varios viajes de Estados Unidos a Argentina, me encontré con un mercado y una competencia tan desafiantes en Sudamérica que decidí instalarme y pelear con todo. Así que estos locos de Stine me usaron como punta de lanza para hacer eso que llaman "enSojar" tu campo. Osea, sembrarme y dejar que mi alto potencial haga su magia.

ZONIFICACIÓN:

- DÍAS A COSECHA (R8):**
147 (FS: 05/11 Vdo. Tuerto).
- ALTURA DE PLANTA:**
85 cm.
- CARACTERÍSTICAS:**
Excelente potencial de rendimiento.
- ZONA:**
Centro y Oeste de Bs. As, Sur de Santa Fé, y Centro y Sur de Córdoba.

ZONA ADAPTACIÓN



■ MAYOR ADAPTACIÓN ■ MENOR ADAPTACIÓN

STINE 47EA32

FECHA DE SIEMBRA:

	OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
Núcleo Norte					●	●	●	●	●	●					
Núcleo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Núcleo Oeste		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sudeste				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sudoeste				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Litoral				●	●	●	●	●	●	●					

Adaptación: ● Verde | Alta ● Verde claro | Media

CARACTERÍSTICAS:

Grupo de Madurez	47
Hábito de Crecimiento	Indeterminado
Días a R1	47
Días a R8	148
Flor	Blanca
Hilo	Castaño oscuro
Pubescencia	Castaña clara
Estructura de planta	Erectofila
Distancia entre hileras <35cm	XX
Distancia entre hileras 35-45cm	XX
Distancia entre hileras >52cm	X
Altura a R8 (cm)	85
Despeje (cm)	14
Nudos (nº)	20
Peso de mil (Gramos)	157
Vuelco	Excelente

Altura a R8



85 cm

SANIDAD:

MOR (Mancha ojo de rana)	Suceptible
Nematodes quiste	Resistente
Phytophthora (Raza 1;3;4;17)	Resistente
Cancro (Diaporthe Meridionalis)	Resistente
Fusarium Sp (***)	0,5
Cercospora Kikuchii (***)	0,5
Septoriosis (***)	0
Bacteriosis (***)	0,5

(X) Menor adaptación / (XX) Máxima adaptación.

(*) Datos de ensayos campaña 21/22, Localidad Vndo Tto, FS: 20-noviembre

(**) Condición normal Venado Tuerto

(***) Escala de 0 a 3 (0= Sin/1=Presente/2=Afectado/3=Muy afectado)

@stinesemillas
www.stinesemillas.com.ar

